



Взаимосвязь между показателями липидного спектра и эндоваскулярной картиной у пациентов с острым коронарным синдромом, перенесших стентирование



Скопец И.С.¹, Везикова Н.Н.¹, Малыгин А.Н.²


1-ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», 2-ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова», ingas@karelia.ru

Цель: оценить взаимосвязь между характером поражения коронарного русла и показателями липидного спектра у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), перенесших стентирование

Материалы и методы:

Результаты:

Всем пациентам в первые сутки госпитализации определен липидный спектр: только у 1 выявлены целевые значения. Проведена оценка взаимосвязи между лабораторными данными и рентгенэндоваскулярным субстратом повторного ОКС. При оценке межгрупповых различий установлено, что у пациентов 2 группы был существенно выше уровень общего ХС ($4,96 \pm 1,47$ vs $4,50 \pm 1,36$ ммоль/л; $p=0,063$) и ЛПНП (ЛПНП $3,01 \pm 1,25$ ммоль/л vs $2,73 \pm 1,30$ ммоль/л).



Группа 1:
Рестеноз/
Тромбоз
стента
(54,3%)

Группа 2:
поражение
de novo
(45,7%)

Заключение: исследование продемонстрировало, что большинство пациентов, госпитализированных по поводу ОКС, ранее переносивших стентирование, в реальной клинической практике не достигают целевых параметров липидного спектра. В группе с поражением de novo отмечалась тенденция к более высокому уровню общего ХС и ЛПНП.