

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ К КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ



Батурина О.А., Андреев Д.А., Чашкина М.И.

Сеченовский университет

Источник финансирования: нет

Фибрилляция предсердий (ФП) регистрируется у 7-15% пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС), при этом возникает необходимость комбинации антикоагулянта и антиагрегантов, что повышает риски геморрагических событий.

Цель:

- изучить приверженность пациентов с ФП, перенесших ОКС, к приему комбинированной антитромботической терапии.


Методы:

С 01.10.2017 по 30.11.2018 в проспективное наблюдательное исследование было включено 228 пациентов с ФП после ОКС. В течение 12 месяцев с пациентами осуществлялись очные или телефонные контакты (1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев). Приверженность к терапии оценивалась с использованием опросника Мориски-Грина.

Результаты:

- Наблюдение закончили 207 пациентов. Среди пациентов 124 (59,9%) принимали тройную терапию, 60 (29,0%) – двойную терапию, 23 (11,1%) – ДАТТ.
- К 12 месяцу продолжили прием антикоагулянтной терапии 83% пациентов, антиагрегантной терапии - 77% пациентов.
- В группе тройной терапии антикоагулянт прекратили принимать 14% пациентов, а антиагрегант/-ты – 19%.

- Из группы двойной терапии преждевременно отменили антиагрегант 32% наблюдаемых, а антикоагулянтную терапию – 23%.
- Большинство пациентов отменили лекарственные препараты без обсуждения с лечащим врачом и при отсутствии показаний к отмене.



Приверженность к антитромботической терапии в течение 12 месяцев

Заключение:

Выявлена недостаточная приверженность к антитромботической терапии: четверть пациентов преждевременно прекратила прием антиагрегантной терапии, пятая часть больных – прием антикоагулянтной терапии. Полученные данные свидетельствуют о недостаточном информировании пациентов о возможности развития тромбоэмболических и повторных ишемических событий.